



BAGOVAC RABIA



Composición

Cada dosis de 1 mL contiene: suspensión de antígeno inactivado de virus rábico desarrollado en células BHK (≥ 2 UI NIH); Sacarosa, 5%; Timerosal, 1:10000; Gel de hidróxido de aluminio, 5%; Buffer de dilución con rojo fenol c.b.p. 1 mL.

Forma farmacéutica y presentación

Suspensión inyectable.

Frasco de vidrio: 1 mL (1 dosis: 12x1 mL y 50 x1 mL) - 20 mL (20 dosis).

Frasco de polipropileno: 10 mL (10 dosis) - 20 mL (20 dosis) - 25 mL (25 dosis).

Indicaciones de uso, especies, dosis y vía de administración

Indicaciones de uso:

Vacuna para la prevención de la rabia canina y felina.

Especie destino: caninos y felinos.

Dosis y vía de administración:

1 mL por vía subcutánea a partir de los 3 meses de edad. Revacunar anualmente.

Advertencias y precauciones

En algunos animales puede observarse una leve tumefacción en el sitio de inyección que desaparece en breve lapso sin medicación alguna. En animales sensibilizados, cualquier producto inyectable puede producir en forma esporádica, reacciones alérgicas. Ante la presentación de síntomas como disnea, temblores, incoordinación, babeo, edema, utilizar adrenalina, corticoides, y/o antihistamínicos, según el criterio del médico veterinario.

Agitar antes de usar. Aplicar en animales sanos y desparasitados. No aplicar si el color de la vacuna ha cambiado a amarillo.

Este producto debe aplicarse bajo prescripción y control del Médico Veterinario, manteniendo las condiciones de asepsia. Mantener fuera del alcance de niños.



Contraindicaciones

No posee.

Condiciones de almacenamiento

Conservar entre 2°C y 8°C, al resguardo de la luz. No congelar.

Periodo de validez

36 meses a partir de la fecha de elaboración.

Certificado de registro:

B-0688-001.