



CRONIBEN®

Acción.

Agente luteolítico a base de D-Cloprostenol, enantiómero dextrógiro sintético de la prostaglandina F2 alfa, en solución inyectable listo para usar para bovinos y porcinos.

Composición.

D-Cloprostenol, 7,5 mg; excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.

Biotécnicas: Sincronización e inducción del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización del ciclo estral en donantes y receptores de programas de transferencia embrionaria. Inducción al parto en cerdas.

Terapéuticas: Desórdenes funcionales de los ovarios. Celos silenciosos por anestros post-servicio o post-parto. Ciclos irregulares o anovulatorios. Cuerpo lúteo persistente. Quistes lúteos.

Enfermedades puerperales: endometritis, piómetras, etc. Abortos terapéuticos en el primer tercio de gestación.

Dosis y vía administración.

La dosis a administrar se debe aplicar por vía intramuscular a razón de 2 mL en bovinos y 1 mL en porcinos. En bovinos, el punto de aplicación es en la tabla del cuello o el cuarto posterior, en porcinos se utiliza la tabla del cuello por detrás de la oreja.

Periodo de retiro.

No sacrificar animales bovinos y porcinos para consumo humano hasta haber transcurrido 24 horas del último tratamiento.

Entre el último tratamiento y el destino de la leche para consumo humano y/o industrialización deben transcurrir 4 horas.

Presentación.

Frascos por 20 mL.

Certificado de registro

Q-0688-021