

ANTIBIÓTICOS



MAXIBIOTIC LA

Acción.

Solución antibiótica inyectable de amplio espectro y acción prolongada para bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. La naturaleza del excipiente de ésta preparación permite:

- Obtener tasas plasmáticas y en tejidos elevadas e inmediatamente eficaces.
- Mantener estas tasas durante tres a cinco días.
- Tratar infecciones con una sola administración aún cuando se trate de procesos agudos.

El espectro de acción de **MAXIBIOTIC LA** es muy amplio, abarcando gérmenes Gram (+) y Gram (-); Micoplasmas, Protozoarios, Rickettsias, Clamidias y Actinomicetos.

Composición.

Oxitetraciclina base 20 gr; excipiente de acción prolongada c.s.p. 100 mL.

Indicaciones.

Bovinos: Neumopatías y gastroenteritis infecciosas, abortos de origen infeccioso, infecciones articulares, pododermatitis, artritis, queratoconjuntivitis infecciosa. Porcinos: Neumopatías y gastroenteritis infecciosas, metritis, mastitis, agalactia, abortos de origen infeccioso, rinitis atrófica. Ovinos y caprinos: pododermatitis infecciosa, abortos provocados por Clamidias y Salmonellas.

Otras indicaciones.

Neumonía del transporte, anaplasmosis, piroplasmosis, leptospirosis y carbunclo sintomático.

Dosis y vía administración.

1 mL cada 10 kg de p.v. (20mg/kg p.v.) por vía intramuscular profunda en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos; y por vía subcutánea en lechones menores de 10 kg de p.v. En caso de infecciones graves, puede aplicarse otra dosis a los tres días.

Período de retiro.

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 28 días. No usar en animales en ordeñe cuya leche se destine a consumo y/o industrialización.

Presentación.

Frasco de 250 mL.

Certificado de registro

Q-0688-006