



RABIA PARESIANTE



Composición

Cada dosis de 2 mL contiene: Antígeno inactivado de Virus Rábico ≥ 2 UI*; Sacarosa, 5%; Timerosal, 1:10000; Gel de hidróxido de aluminio, 5%; Buffer de dilución con rojo fenol c.b.p. 2 mL.

* Prueba NIH

Forma farmacéutica y presentación

Suspensión inyectable.

Frasco de polipropileno: 20 mL (10 dosis) – 40 mL (20 dosis) – 50 mL (25 dosis) – 100 mL (50 dosis).

Indicaciones de uso:

Vacuna inactivada de virus rábico para la prevención de la e derriengue en bovinos. Especie destino: bovinos.

Dosis y vía de administración:

2 mL por vía intramuscular o subcutánea cualquiera sea el peso o la edad del animal. Si se vacunan animales antes de los 6 meses de edad, se recomienda su revacunación 6 meses después. Revacunar anualmente.

Advertencias y precauciones

En algunos animales puede observarse una ligera tumefacción en el sitio de inyección que desaparece en breve lapso sin medicación alguna. En animales sensibilizados, cualquier producto inyectable puede producir en forma esporádica, reacciones alérgicas. Ante la presentación de síntomas como disnea, temblores, incoordinación, babeo, edema, utilizar adrenalina, corticoides, y/o antihistamínicos, según el criterio del médico veterinario. Agitar antes de usar. Si el color de la vacuna ha virado al amarillo, no aplicar.

Este producto debe aplicarse bajo prescripción y control del Médico Veterinario, manteniendo las condiciones de asepsia. Mantener fuera del alcance de niños.

BIOLÓGICOS



Contraindicaciones

No posee.

Condiciones de almacenamiento

Conservar entre 2°C y 8°C, al resguardo de la luz. No congelar.

Periodo de validez

24 meses a partir de la fecha de elaboración.

Certificado de registro

B-0688-002